

北美同工们的重要交通

(请阅读并发布)

亲爱的北美众召会的负责兄弟们：

我们正面临一场严峻的全球性瘟疫，该瘟疫源自一种新型冠状病毒，俗称新冠肺炎（COVID-19）。为了保护众圣徒和各地召会，我们必须与主同工，一同应对挑战。

盼望我们不会因为对当前局势之严重性缺乏适当、清醒的认识而疏于防范和保护。鉴于这次疫情的潜在影响可谓百年未遇，我们很容易低估未来的严峻局势。

以下因素可能会使我们低估此次疫情的严重性：

- 1) 新冠肺炎的传染性超过流感，可以通过处于病毒潜伏期的无症状感染者悄然传播。
- 2) 高达 80%的病例初期症状轻微；许多出现轻微症状的感染者没有得到医疗救治，也没有接受检测；他们可能不会因为出现轻微症状而“自我隔离”，因此可能导致病毒继续传播。
- 3) 得到病毒检测的机会仍非常有限，轻微症状的感染者可能由于没有机会接受检测，而不在报告统计人数之列；若未进行病毒检测，即使病毒已在社区传播，也不会被纳入病例报告。
- 4) 受感染者的症状通常较为轻微，只有约 20%的重症感染者才能要求接受住院治疗。此外，根据美国公布的确诊病例数，新冠肺炎的死亡率比流感高出 15-30 倍。
- 5) 若不全力开展广泛合作以遏制病毒，美国的医院和重症监护病房预计将不堪重负。
- 6) 65 岁及以上的病毒感染者发生严重并发症的风险特别高，如若他们患有糖尿病、高血压、冠状动脉疾病、肾病、恶性肿瘤等慢性疾病或正在服用免疫抑制药物，则更是如此。
- 7) 中青年感染者也存在发生严重并发症的风险；迄今为止，在美国的住院感染者中，有 20%的人年龄在 20-44 岁。
- 8) 儿童和青少年感染者尽管症状比较轻微，但可能会带来严重的社区传播。
- 9) 认为美国民众无论住在哪里，都会比迄今为止疫情严重国家的民众更不容易受到感染，乃是不明智的想法。尽管初期病例集中于交通繁忙的城市中心，但由于美国尚未限制境内旅行，所有的州和地区都有可能出现感染病例，并在社区广泛传播。

专家敦促所有美国民众尤其要注意以下三个问题：

- 1) 扩大社交距离：病毒是通过直接接触、受污染表面，特别是感染者咳嗽、打喷嚏或说话时悬浮于空气中的含病毒飞沫进行人际传播。人与人之间若保持六英尺的距离，受感染的可能性会小得多。

- 2) 待在家中：唯有严格限制社区接触，才可能阻止新冠肺炎的传播。3月16日总统颁布的冠状病毒指导方针就遵循这一原则，要求在全国范围避免10人以上的聚集，并请求年长者待在家中。加州已禁止举行非必要的公共聚集。截至目前，已经有几个州下达了禁足令，要求民众待在家中，这项禁令波及25%的美国民众。其他州也极有可能跟进，一些权威机构倡议在全国范围实施禁足令。
- 3) 避免一切不必要的旅行。

关注当前疫情不仅是为了维护主的权益，因为这关系到众圣徒的健康与生命；而且，为抑制并最终控制新冠肺炎作出贡献，也是我们应尽的义务。

疫情在美国得到控制之前，我们恳请北美众召会的负责弟兄们尽可能做到以下几点：

- 1) 负责弟兄们尤其要待在家中。由于年龄和健康状况，他们受感染的风险比较高，并且在美国出现的新冠肺炎死亡病例中，男性的数量是女性的1.5-2倍。我们年长的负责弟兄们显然面临着较高的感染风险。

- 2) 地方召会及召会之间要有交通，思考如何能够最有效地敦促圣徒们遵守以上原则，并听从政府和公共卫生部门制定的一切指导方针。

- 3) 鼓励所有圣徒尽可能待在家中，在外出时则要保持社交距离；65岁以上或患有慢性疾病的圣徒，尤其需要待在家中。

- 4) 提供并安排一切必要的技术支持，使圣徒们能够继续远程参加聚会。我们建议，所有大小聚会都应通过电话会议的方式进行，以确保每一位圣徒都能居家参与。

- 5) 鼓励圣徒们勤洗手，使用手消毒剂，经常给触摸次数多的物体表面消毒，相关指导可以参看疾控中心网站：cdc.gov。

- 6) 教导青少年保持社交距离，并说明其重要性，告诫他们努力付诸实行。

- 7) 敦促祖父母自我保护，不仅要待在家中，还要限制与孙儿女的身体接触。

- 8) 告诉众圣徒，主正看顾祂的恢复、祂的众圣徒，以及众召会，为使他们得安慰；敦促众圣徒献上自己以祷告主来使用目前的情形，推进祂在地上的行动。

按目前情势来看，美国新冠肺炎感染者的人数可能不久就会超过意大利和中国公布的确诊数，成为受疫情影响最严重的国家。为遏制这种趋势，众圣徒应连同全体美国民众全力以赴，对抗疫情。

愿主赐给我们所需的智慧、毅力及彼此的顾惜，以保护众圣徒，并尽可能地、尽早地抑制新冠肺炎疫情的大流行。

北美同工们（与医生弟兄们协商）

2020年3月21日